

La enfermedad renal diabética o nefropatía diabética está incluida dentro de las complicaciones microvasculares de la diabetes. junto a la



retinopatía.

seguimiento periódico en todos los pacientes diabéticos para evitar su aparición o tratarla lo más tempranamente posible.

Atención:

Es importante realizar un

20 y 40 %

Ocurre entre el **20 y 40** % de los pacientes con diabetes y es la principal causa de enfermedad renal terminal.

27,9 %

Se estima que el 27,9 % de los pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) tienen enfermedad renal crónica.



ENFERMEDAD RENAL EN PACIENTES DIABÉTICOS

cehealth

Signos:

Algunos signos de ERC avanzada incluyen tobillos hinchados, fatiga, dificultad para concentrarse, disminución del apetito y orina espumosa.



Detección de la ERC:

La ERC en estadíos tempranos no muestra síntomas. Una persona puede perder hasta el 90% de su función renal antes de mostrar algún signo.

Pero puede ser detectada con estas sencillas pruebas:

- Examen de orina para verificar no haya rastros de proteína
- Examen de sangre para medir el nivel de creatinina



Tratamiento de la enfermedad renal diabética

- Control de la glucemia
- Control de la presión arterial
- Restricción proteica de la dieta
- Abordaje y control de otros factores de riesgo cardiovascular
- Dejar de fumar
- Detección precoz



